

آمادگی های لازم جهت انجام اکومری :

- شش ساعت ناشتا(NPO) باشد.
- آنتی کوآگولانت مصرف نکرده باشد.
- Clexan از ۱۲ ساعت قبل قطع گردد.
- Heparin از ۶ ساعت قبل قطع گردد.
- warfarin، از  $INR < 2.5$  و از روز قبل قطع گردد.
- Iv Line دست راست داشته باشد .
- دندان مصنوعی نداشته باشد.
- مدارک قبلی همه ضمیمه باشد.
- رضایت آگاهانه جهت انجام اکومری داشته باشد.
- وسایل مورد نیاز نسخه همراه بیمار به کلینیک قلب آورده شود.
- سابقه حساسیت دارویی یا هرگونه بیماری خاص از بیمار سوال شود .
- مشاوره بیهوشی انجام گردد .

وسایل لازم جهت اکومری

ردیف	نام وسیله	تعداد
1	سه راهی قرمز	1 عدد
2	ست سرم	1 عدد
3	سرم نرمال سالین ۵۰۰ سی سی	1 عدد
4	سرنگ ۵ سی سی	2 عدد
5	سرنگ ۱۰ سی سی	3 عدد
6	آمپول میدازولام ۵ میلی گرم	1 عدد
7	آب مقطر	6 عدد
8	دهانی کش دار	1 عدد
9	سوند نازال	1 عدد
10	دروشیت	1 عدد
11	آمپول لیدوکائین ۲ %	1 عدد
12	پماد زایلوکائین ۲ %	1 عدد
13	آمپول پروپوفول ۲۰ سی سی	1 عدد
14	هپارین لاک	2 عدد
15	نلاتون سبز	1 عدد