



www.nikanhospital.com

www.nikanhospital.com



خونریزی و لکه بینی
در بارداری

تهران، میدان اقدسیه، خیابان ۲۲ بهمن، شماره ۶
تلفکس: ۲۲۹۳۰۱۸۴، تلفن: ۲۹۱۲۹۰



خونریزی و لکه بینی در بارداری

خونریزی و لکه بینی در بارداری به دو دسته تقسیم می شود:

- ۱ - خونریزی های نیمه اول بارداری
- ۲ - خونریزی های نیمه دوم بارداری
- ۳ - خونریزی های نیمه اول بارداری

خونریزی در مراحل اول اولیه بارداری می تواند به علل مختلف باشد.

مثلا: احتمال سقط قرار گرفتن جفت در قسمت پایین رحم و یا حاملگی خارج رحمی

نکته: ۹۰٪ جفتها زیر هفته ۲۶ پایین هستند.

درمان

در صورتی که احتمال سقط و قرار گرفتن جفت در قسمت پایینی رحم باشد استراحت و عدم انجام مقاربت و درمان دارویی می تواند موثر باشد.

اما در صورتی که لکه بینی و خونریزی به علت حاملگی خارج از رحم باشد سریعاً باید درمان جراحی و یا دارویی انجام شود و حاملگی خاتمه داده شود چون خطرات بسیار زیادی دارد.

علائم

- * خونریزی کم در حد قاعدگی
- * درد شکم مشابه دردهای قاعدگی
- * اسهال و تهوع و استفراغ در بعضی مواقع پیشرفته که به علت خونریزی داخلی ایجاد می شود.
- * در سونوگرافی شکمی در حالی که میزان **BHCG** بیشتر از ۵۰۰۰ است ساک حاملگی در رحم دیده نمی شود و در سونوگرافی داخلی در حالی که میزان **BHCG** بیشتر از ۲۰۰۰ است ساک حاملگی در رحم دیده نمی شود.

خونریزی نیمه دوم بارداری

خونریزی در این مرحله می تواند علل مختلف داشته باشد:

- ۱ - جفت در محل پایین قرار دارد.
- ۲ - جفت زودتر از وقت جدا شده است.
- ۳ - نشانه شروع زایمان.

علائم

- * درد شکم
- * تغییر در صدای قلب جنین
- * انقباض رحمی
- * ترشحات خونی

درمان

در موارد جدا شدن زودتر از موعد جفت باید هر چه زودتر بارداری خاتمه یابد.

در موارد پایین قرار گرفتن جفت با نظر پزشک استراحت و چک حرکات و ضربان قلب جنین و در صورت بیشتر شدن خونریزی ختم بارداری انجام شود.

نکته:

سن بارداری نیز در تصمیم گیری مهم است.

در مواردی که خونریزی و ترشحات خونی همراه با انقباض باشد نشانه شروع زایمان است که بهترین اقدام مراجعه زودتر به پزشک است که در صورت امکان با درمان دارویی دردها را کاهش داده و از زایمان زودتر از موعد جلوگیری شود و در صورت عدم درمان و قطع دردهای زایمان ختم بارداری داده می شود.

در کل انجام سونوگرافی و انجام نوار قلب جنین با نظر پزشک انجام شود.

نکته:

در مواردی که جفت جلوتر قرار گرفته است بهتر است بررسی سونوگرافی جهت مهاجرت جفتی انجام شود. (در هفته ۲۸ - ۳۲)

نکته:

خانم های با گروه خونی منفی که همسرشان دارای گروه خونی مثبت هستند بهتر است در صورت خونریزی و یا سقط جنین از آمپول روگام به تجویز پزشک استفاده کنند.

