

آمادگی کولونوسکوپي يکروزه

انجام کولونوسکوپي به معنای دیدن روده بزرگ به صورت کامل با دستگاه اسکوپي می باشد که انجام آن در بخش اسکوپي تحت نظارت متخصص بیهوشی و بدون هیچگونه درد و ناراحتی صورت می گیرد نحوه آمادگی لازم پیش از انجام کولونوسکوپي در این دستورالعمل آمده است

داروهای مصرفی : لطفا داروهای زیر از داروخانه تهیه شود:

۱- شیاف بیزاکودیل دو عدد

۲- قرص متوکلوپرامید دو عدد

۳- پودر پیدرولاکس ۴ بسته

۴- قرص بیزاکودیل ۴ عدد

- طریقه حل نمودن پودر پیدرولاکس:
- پودر پیدرولاکس : هر بسته را با ۴ لیوان (یک لیتر) آب با مقدار کمی آب لیموترش حل نموده و در عرض یک ساعت هر یک ربع یک لیوان میل نمایید

نحوه مصرف داروها:

- ✓ شب قبل از شروع آمادگی کولونوسکوپي فقط سوپ میل شود.
- ✓ از ساعت ۶ صبح روز قبل از کولونوسکوپي مایعات صاف شده شروع شود.
- ✓ ساعت ۹ صبح روز قبل از کولونوسکوپي ۱ عدد قرص متوکلوپرامید میل شود.
- ✓ ساعت ۱۰ الی ۱۲ روز قبل از کولونوسکوپي ۲ بسته پودر پیدرولاکس طبق دستور حل نموده و میل نمائید.
- ✓ ساعت ۱۳ دو عدد قرص بیزاکودیل میل شود.
- ✓ ساعت ۱۶ یک عدد قرص متوکلوپرامید میل شود.
- ✓ ساعت ۱۷ الی ۱۹ دو بسته پودر پیدرولاکس طبق دستور حل نموده و میل شود.
- ✓ ساعت ۲۰ دو عدد قرص بیزاکودیل میل شود.
- ✓ ساعت ۲۱ یک عدد شیاف بیزاکودیل استعمال شود

✓ ۸ ساعت قبل از حضور در بخش جهت انجام کولونوسکوپی کاملا ناشتا باشید و حتی آب هم میل نشود.

✓ ساعت ۶ صبح روز مراجعه یک عدد شیاف بیزاکودیل استعمال شود

● توضیحات :

- در حین آمادگی لطفا پیاده روی فراوان داشته باشید.
- مایعات صاف شده شامل آب گوشت و آب مرغ و شیره مربا و آب میوه بدون پرز و چای کم رنگ و عسل و هر نوع مایعات صاف شده دیگر می باشد . لطفا این مایعات به مقدار فراوان مصرف گردد و از مصرف مایعات قرمز یا بنفش رنگ خودداری شود.
- از خوردن غذاهای سفت مثل گوشت ، نان ، برنج و حتی آش و سوپ و شیر و دوغ و غذاهای میکس شده اکیدا خودداری شود.
- داروهای قلبی و فشار خون طبق دستور پزشک معالج قلب خود میل شود.
- انسولین و داروهای ضد قند با هماهنگی پزشک معالج غدد خود میل نشود
- روز قبل از مراجعه حتما استحمام نموده و موهای ناحیه مقعد شیو گردد.
- لطفا مسئول بخش را از هرگونه حساسیت دارویی مطلع فرمایید.
- لطفا مسئول بخش را از مصرف داروهایی مانند وارفارین و هپارین و کلگزان و آسپرین و سایر داروهای رقیق کننده خون مطلع فرمایید.
- در روز مراجعه حتما یک نف همراه با خود داشته باشید.
- لطفا مسئول بخش را از سابقه عمل جراحی قبلی شکم و معده و روده مطلع فرمایید.
- خانم ها در روز مراجعه از لاک ناخن و رژ لب استفاده نکنند.
- مددجو الزاما قبل از انتقال به اتاق اسکوپ در بخش اورژانس از سرویس بهداشتی WC استفاده نماید.
- در صورت مصرف قرص آهن ، بیسمورت ، شارین و یا سولفات باریوم از ۳ روز قبل از مراجعه مصرف آن ها قطع گردد.
- ❖ سه روز قبل از مراجعه جهت اطمینان از حضور یا هرگونه سوال با شماره ۰۱۵۲۱۲۹۱ تماس حاصل فرمائید.