

چطور کودک را برای بیهوشی آماده کنیم

اگر کودک شما نیاز به عمل جراحی داشته باشد قطعاً سوالاتی در مورد بیهوشی کودکتان در ذهن شما نقش می‌بندد. ممکن است نگران احساس درد در حین عمل باشید یا تصور کنید که کودکتان در حین عمل بیدار شود یا در طول عمل احساس ناراحتی کند.

بیهوشی مدرن در بیمارستان‌ها یا مراکز جراحی در حال حاضر تحت مونیتورینگ مستقیم و مداوم و با استفاده از آخرین متدهای پیشرفته و بی خطرترین داروها انجام می‌شود لذا پیشرفت علم و تکنولوژی، امروزه بیهوشی را به اقدامی کم خطر تبدیل کرده است.

ممکن است کودک تحت جراحی کوچک و سرپایی یا تحت جراحی بزرگ با زمان ریکاوری طولانی قرار گیرد بنابر این لازم است برای این امر مهم آماده باشید. حفظ آرامش، کسب اطلاعات کافی و اطمینان بخشی به کودک در مورد جراحی و بیهوشی از مهم ترین نیازهای شما و کودکتان هستند.

سن کودک و سطح درک او عامل مهمی در احساس ترس و اضطراب حول و هوش بیهوشی و جراحی است، بعضی کودکان مخصوصاً کوچکترها ممکن است چنان اضطراب جدا شدن از والدین شوند. گاهی همراهی پدر یا مادر در اتاق قبل از اتاق عمل در کاهش این ترس نقش بسزایی دارد.

بچه‌های بزرگتر ممکن است ترس‌های پیچیده نری داشته باشند. ترس از عربیان شدن، ترس از برش و سوزش، ترس از بیداری حین عمل جراحی، ترس از درد بعد از عمل و یا حتی ترس از مرگ میتواند ذهن این کودکان را درگیر کند.

یکی از دلایل مشترک ترس کودکان و بزرگسالان اضطراب ناشی از انتظار برای وارد شدن سوزن است، استفاده از نوعی کرم (CREAM) برای بی‌حسی موضعی ناحیه رگ گیری، درد ناشی از سوراخ شدن پوست با سوزن یا آنژیوکت را کاهش می‌دهد.

در بعضی موارد براساس نوع عمل و نوع بیهوشی می‌توان با استفاده از داروی خوراکی، آرامش و حتی خواب آلودگی قبل از ورود به اتاق عمل ایجاد کرد. از طرف دیگر در بعضی موارد امکان بیهوشی از طریق استنشاق هوشبرهای تبخیری قبل از کارگذاری آنژیوکت وجود دارد.

صحبت با کودک توسط والدین در مورد عمل جراحی، بیهوشی و حواسی آن در ایجاد آرامش و رفع استرس کودک کمک کننده است. از نکات مهم اطلاع رسانی به کودک این است که کودک بداند در حین انجام جراحی شما کجا هستید؟ لذا به کودک اطمینان دهید که نزدیک او و در اتاق انتظار بسر خواهد برد. در بعضی موارد ممکن است بتوان شرایطی ایجاد کرد تا زمان بیهوش شدن کودک در کنار او باشید در این مورد می‌توانید با متخصص بیهوشی کودک خود صحبت کنید.

در اغلب اعمال جراحی سرپایی می‌توان کودک را به فاصله کوتاهی بعد از جراحی به منزل منتقل کرد. در موارد نیاز به بستری طولانی مدت اغلب بیمارستان‌ها شرایطی را برای همراهی حافظ یکی از والدین فراهم می‌کنند.

اطلاع رسانی به کودک را براساس سن و فرهنگ و سطح پذیرش وی انجام دهید. به عنوان مثال برای بچه‌های کوچکتر اطلاع رسانی سطحی بهتر است. وقتی به کودکان از جزئیات بگوئید ممکن است ترس و اضطراب آن‌ها را افزایش دهید. می-

توانید به کودک بگویید یک دکتر متخصص با دادن دارو باعث می شود که شما به خواب خوب و خیلی عمیقی فرو روید و هیچگونه درد و ناراحتی را حس نکنید . یا می توانید به کودک بگویید که شما فقط در یک ماسک خلبانی تنفس می کنید و سپس به خواب می روید . با خوابانیدن کودکان از طریق استنشاق داروی بیهوشی ، به راحتی استفاده از لوله های تنفسی و داروهای وریدی و در بعضی موارد رگ گیری امکان پذیر میشود . مخصوصاً به کودکان بزرگتر و نوجوانان باید پادآوری کرد که در هنگام عمل جراحی بیدار نخواهد شد و بیداری آن ها بعد از جراحی و در اتاق ریکاوری صورت خواهد گرفت .

از بکارگیری کلمات ترسناک پرهیز کنید به عنوان مثال نگویید به تو گاز خواهند داد و یا تو را مجبور به خوابیدن می کنند . ممکن است کودک کلمه گاز را به ماده سوختی که خطر مسمومیت یا مرگ را دارد تعبیر کند یا کلمه برو بخواب را به آنچه به حیوان خانگی دیگته می کنند تعبیر کند . کودک را تهدید نکنید که اگر همکاری نکند یا بدرفقاری کند به او آمپول خواهند زد . به سوالات کودک با صداقت جواب دهید در صورتیکه جواب سوالات او را نمی دانید به او اطمینان دهید که سوالات او را از پژشک خواهید پرسید .

به کودک توضیح دهید که ممکن است بعد از عمل کمی درد یا احساس ناراحتی را تجربه کند اما پژشک با تجویز دارو به او کمک خواهد کرد . برای کودکان مهم است بدانندکه نیازی به شجاع نمایی یا داشتن صورت خندان بعد از عمل ندارد . به کودک توضیح دهید که هرگونه درد یا ناراحتی بعد از عمل را باید به پژشک معالج اطلاع داد تا به کودک در رسیدن به حال خوب کمک کند .

به کودک توضیح دهید که کمی احساس بیحالی بعد از عمل طبیعی است اگرچه واکنش افراد به داروها مقاومت است اغلب کودکان بعد از آرامبخشی یا بیهوشی عمومی ممکن است احساس ضعف ، گیجی ، لرز ، تهوع یا حتی غمگینی را بعد از قطع داروهای بیهوشی داشته باشند . به کودک توضیح دهید ممکن است به طور موقت در هنگام بیداری احساس عصبی داشته باشد که طبیعی است و به وی اطمینان دهید که در کنارش خواهید بود . مطمئن شوید که آنچه به کودک می گویید همان است که پژشک به شما گفته است چرا که وقوع اتفاقات غیر مترقبه به او آسیب خواهد زد .

به کودک پادآوری کنید که فراموش کردن اتفاقات حول و حوش جراحی امری طبیعی و ناشی از داروهای بیهوشی است . یکی از داروهایی که در پروتکل بیهوشی تزریقی استفاده می شود تا زمانی که کاملاً از بدن پاک نشده باشد خاصیت فراموشی موقت را دارد .

آرامش خود را حفظ کنید : وقتی در مورد جراحی ، بیهوشی و بستری در بیمارستان با کودک خود صحبت می کنید اطمینان و آرامش را ایجاد کنید . تون صدای شما ، حالات چهره ، زبان بدن شما و قیافه ای که می گیرید می توانند پیام های فدرتمندی باشند . مهم است که بیاد داشته باشید قبل و بعد از جراحی در حضور کودک گریه نکنید یا هیجانی نشوید . در صورتیکه نمی توانید احساسات خود را کنترل کنید از اتاق کودک بیرون روید و قدم بزنید تا کودک قادر به دیدن احساسات و هیجانات شما نباشد .

حضور آرام و حمایتگر شما قبل و بعد از عمل این تجربه را برای شما و کودکتان آسان تر و با استرس کمتری خواهد کرد .

دکتر علی باقرنیا

متخصص بیهوشی و مراقبت های ویژه