

کولونوسکوپ عصر

آمادگی کولونوسکوپی یک روزه جهت بیماران عصر

انجام کولونوسکوپی به معنای دیدن روده بزرگ به صورت کامل با دستگاه اسکوپی می باشد که انجام آن در بخش اسکوپی تحت نظر متخصص بیهوشی و بدون هیچگونه درد و ناراحتی صورت می گیرد. نحوه آمادگی لازم پیش از انجام کولونوسکوپی در این دستورالعمل آمده است.

◀ داروهای مصرفی (لطفا داروهای زیر از داروخانه تهیه شود)

۱) پودر پیدرولاکس ۴ بسته

۲) شیفاف بیزاکودیل ۲ عدد

لطفا به تمامی نکات ذکر شده توجه نمایید تا بتوانیم کولونوسکوپی شما را همان بار اول به طور کامل انجام دهیم و نیاز به تکرار این کار به علت آماده نبودن روده بزرگ نباشد.

◀ طریقه حل نمودن پودر پیدرولاکس

هر بسته را با ۴ لیوان (یک لیتر) آب با مقدار کمی آب لیمو ترش حل کرده و در عرض یک ساعت، هر یک ربع یک لیوان میل نمایید.

◀ نحوه مصرف داروها

از ساعت ۶ صبح روز قبل از مراجعه فقط مجاز به مصرف مایعات صاف شده می باشید.

۵ بسته پودر پیدرولاکس را، یک روز قبل از کولونوسکوپی از ساعت ۱۱ تا ۲۳ میل نمایید.

یک بسته پودر پیدرولاکس در روز کولونوسکوپی از ساعت ۶ تا ۸ صبح میل نمایید.

یک عدد شیفاف بیزاکودیل از روز قبل از کولونوسکوپی ساعت ۲۱ و دیگری روز کولونوسکوپی ساعت ۹ استفاده گردد.

در صورت داشتن تهوع و عدم تحمل خوردن محلول هر ۸ ساعت یک عدد قرص اندانسترون استفاده نمایید..

۶ ساعت قبل از حضور در بخش جهت انجام کولونوسکوپی کاملاً ناشتا باشید و حتی آب هم میل نشود.

توضیحات:

◀ در حین آمادگی حتما پیاده روی فراوان داشته باشید.

◀ از خوردن آب هندوانه، آب هویج، آب انار و آب انگور به همراه هسته های آن جداً خودداری فرمایید.

◀ مایعات صاف شده شامل آب گوشت، آب مرغ، شیر، مربا، آب میوه بدون پالپ، چای کم رنگ، عسل و هرنوع مایعات صاف شده دیگر می باشد. لطفا این مایعات به مقدار فراوان مصرف گردد و از مصرف مایعات قرمز یا بنفش رنگ خودداری کنید.

- ◀ از خوردن غذاهای سفت مثل گوشت، نان، برنج و حتی آش، سوپ، دوغ و غذاهای میکس شده اکیدا خودداری شود.
- ◀ داروهای قلبی و فشارخون خود را طبق دستور پزشک معالج قلب میل نمائید.
- ◀ انسولین و داروهای ضد دیابت با هماهنگی پزشک معالج غدد خود میل نشود.
- ◀ روز قبل از مراجعه حتما استحمام نموده و موهای ناحیه مقعد شیو گردد.
- ◀ لطفا پرستار بخش را از هرگونه حساسیت دارویی مطلع فرمایید.
- ◀ در صورت مصرف داروهای رقیق کننده خون مثل (وارفارین، پلاویکس، آسپیرین، زالربان، زارلتو، ریواروکسابان، دابیگاتران، پاراداکسا و...) با پزشک معالج قلب خود مشاوره و با تایید ایشان جهت انجام کولونوسکوپی از چهار روز قبل قطع نمایدو سپس مراجعه نمایید.
- ◀ در روز مراجعه حتما یک نفر همراه با خود داشته باشید.
- ◀ لطفا مسئول بخش راز سابقه عمل جراحی قلبی شکم، معده و روده مطلع فرمایید.
- ◀ مددجو الزاما قبل از انتقال به اتاق اسکوپى از سرویس بهداشتی استفاده نماید.
- ◀ در صورت مصرف قرص آهن، بیسموت، شاربن و یا سولفات باریوم از ۳ روز قبل از مراجعه مصرف آنها قطع گردد.
- ◀ در صورت مصرف وارفارین با صلاح دید پزشک معالج قلب از پنج روز قبل قطع گردد و بیمار در روز مراجعه جواب آزمایش PTT، PT و INR به همراه داشته باشد
- ◀ افراد بالای ۵۰ سال در صورت داشتن سابقه بیماری قلبی، فشارخون و دیابت در روز مراجعه، تاییدیه قلب برای بیهوشی الزامی است.
- ◀ افراد بالای ۶۰ سال در روز مراجعه تاییدیه قلب برای بیهوشی الزامی است.
- ◀ از به همراه آوردن اشیاء قیمتی، طلا، وسایل زینتی و فلزی و انواع پرسینگ خودداری کنید.
- ◀ به همراه داشتن نسخه پزشک و کارت ملی جهت پذیرش الزامی است.
- ◀ بیماران محترم وقت تعیین شده کاملاً تقریبی است.
- سه روز قبل از مراجعه جهت اطمینان از حضور پزشک و یا در صورت بروز هرگونه سوال با شماره های ۰۲۱-۲۹۱۳۱۰۱۵ و ۰۲۷-۱۸۹۶۸۰۲۷ فقط از طریق واتس اپ تماس حاصل نمایید.